



**Clavis<sup>®</sup>**

# EL ESPECIALISTA — CONTRA — COGOLLERO



MAICES  
GANADORES

PROTECCIÓN  
CONTRA  
COGOLLERO

## ¿QUÉ ES?

**Clavis®** es el nuevo insecticida de Bayer® especialista en el control de gusano cogollero.

## ¿CÓMO TRABAJA?

**Clavis®** actúa por contacto e ingestión. Controla a las larvas de cogollero cuando éstas se alimentan de las hojas impregnadas del producto (ingestión) y cuando el producto cae directo sobre la larva (contacto). También **controla huevecillos** si el producto cae sobre ellos, secándolos y rompiendo así el ciclo de la plaga.

## BENEFICIOS

- Brinda control hasta por 14 días\*.
- Actúa sobre huevecillos y larvas de cogollero, (L1 a L3).
- Doble modo de acción: contacto e ingestión.
- Ofrece el menor costo por día de control. \*\*
- Puede usarse en un manejo integrado de plagas para disminuir la potencial aparición de generaciones resistentes a las diamidas. \*\*\*



Presentaciones disponibles:  
**350 mililitros y 1.05 litros**

Adquiere el producto solo con  
Distribuidores autorizados.

\*Dependiendo de las condiciones ambientales y de la calidad de la aplicación.

\*\*En comparación con los días de control que ofrecen otros tratamientos disponibles en el mercado.

\*\*\*Comúnmente usadas en tratamientos a la semilla.



# Clavis®

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

### Clavis®

VENTANA DE APLICACIÓN

DOSIS: 350 ml/ha

V1

V2

V3

V4

V5

V8

- » Aplica **Clavis®** directo al cogollo.
- » Usa boquillas de cono lleno.
- » Usa agua limpia con pH de 5.5 a 6.5, estabiliza la dureza.
- » No apliques con vientos fuertes ni con lluvia.
- » No lo mezcles con sulfato ferroso.
- » Siempre realiza la calibración del equipo de aplicación.
- » Siempre usa el equipo de protección personal y sigue las indicaciones de la etiqueta del producto.

Recuerda monitorear tu cultivo en etapa V2, y si detectas daños leves en las hojas o larvas de cogollero en estadíos L1 a L3 será el **momento oportuno** para controlar a la plaga.

## ¿CÓMO ACTÚA CLAVIS® EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS TRAS SU APLICACIÓN?

**Clavis®** controla al cogollero desde las primeras horas tras su aplicación. Conoce los efectos\* de **Clavis®** sobre la plaga y permite que tu cultivo se mantenga protegido hasta por 14 días con la ayuda del especialista.

### DÍA 1

- Las larvas paran de comer y cambian de color.

### DÍA 2

- Cambio de coloración en los huevecillos.
- Las larvas reducen su movilidad.

### DÍA 3

- Larvas inmóviles y secas.
- Huevecillos deshidratados.

CONTROLA DESDE EL INICIO AL COGOLLERO CON

# Clavis®



# Clavis®

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Maíz (28)	<b>Gusano Cogollero</b> <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.35 - 0.4	Realizar la aplicación cuando se observen las primeras plantas dañadas o la presencia de larvas de gusano cogollero en el cultivo. Utilizar 190 a 290 L de agua /Ha en el estado vegetativo V3 - V4. Usar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado vegetativo de la planta. Fuente LMR Tiodicarb: EPA. Fuente LMR Triflumurón: Unión Europea.

\*Para su aplicación utilice boquillas de cono lleno.  
El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.  
( ) I. de S.: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

Realice el triple lavado al envase vacío, perfore, separe la tapa del envase para disponerlo y consulte los centros de acopio más cercanos a su localidad en <https://www.campolimpo.org.mx> o al teléfono (55) 56 61 10 35.

PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
DESCARGA LA APP



DA CLIKC EN  
ESTE CÓDIGO QR.

Bayer®,  y Clavis® son marcas registradas de Grupo Bayer. D.R. © Bayer, México, 2022. Categoría Toxicológica: 3 Peligro. CLAVE DE AUTORIZACIÓN: 203300201A0134. "ESTE PRODUCTO ES LIGERAMENTE TÓXICO", "NO SE DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS", "LEA PREVIAMENTE LAS INSTRUCCIONES". Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información entra a [www.micultivo.bayer.com.mx](http://www.micultivo.bayer.com.mx)